

การเลี้ยงเป็ดรุ่น



การจัดการเป็ดรุ่น 6-12 สัปดาห์

1. ควรให้อาหารที่มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 12%
2. ควรมีผักหรือหญ้าสับให้กินในช่วงเวลากลางวัน
3. เลี้ยงอยู่ภายในโรงเรือน โดยไม่ปล่อยออกนอกโรงเลี้ยง
4. ควรถ่ายพยาธิครั้งแรกเมื่ออายุ 1-2 เดือน และทุกๆ 6 เดือน
5. จัดทำวัคซีนตามโปรแกรม

การเลี้ยงเป็ดฟ่อ แม่พันธุ์



การเลี้ยงเป็ดไข่แบบปล่อยคลุมฝูงผสมพันธุ์ อัตราส่วน ระหว่างพ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ คือ 1 : 5-7 โดยอยู่ภายในบริเวณโรงเรือน ควรให้อาหารที่มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 16%

โรงเรือนเลี้ยงเป็ดฟ่อ แม่พันธุ์ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ



2. พื้นที่ลานด้านนอก ควรมีพื้นที่ 1 - 2 เท่า ของโรงเรือนนอน 1 ตร.ม. / เป็ดฟ่อแม่พันธุ์ 3 - 4 ตัว มีตะขอยึดล้อมรอบบริเวณลาน ป้องกันเป็ดออกและไม่ให้ศัตรูเข้ารบกวน



ช่วงบ่ายให้หญ้าสับ ขนาด 1-2 ซม. เพื่อเพิ่มวิตามินลดความเครียด หญ้าที่เหมาะสมที่ให้เป็ดกินคือหญ้าขน, กระจับเตยผัก ถ้านำหญ้าหรือเศษผักจากแหล่งอื่นมาให้เป็ดกินควรนำมาล้าง หรือแช่ด้วยด่างทับทิมประมาณ 5-10 นาที

การเตรียมโรงเรือนก่อนนำสัตว์เข้าเลี้ยง

ก่อนนำสัตว์เข้าเลี้ยงครั้งต่อไป ควรทำความสะอาดสะอาดโรงเรือนก่อนทุกครั้ง โดยนำเอาวัสดุรองพื้นออก และล้างทำความสะอาดควรฉีดพ่นด้วยยาป้องกันกำจัดเชื้อโรคและโรยด้วยปูนขาวทันที และทิ้งไว้ประมาณ 7-14 วัน จึงนำสัตว์เข้าเลี้ยง



เปิดบางปะกง



องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

ชื่อท้องถิ่น: เป็ดบางปะกง

ชื่อสามัญ: เป็ดบางปะกง (Bang Pa Kong Duck)

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Anas platyrhynchos*



แหล่งที่เลี้ยง: ได้รับการพัฒนา และปรับปรุงพันธุ์โดยกรมปศุสัตว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เลี้ยงและขยายพันธุ์ที่ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

**ปัจจุบันได้ย้ายฐานการวิจัยและผลิตลูกเป็ดไปที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก จ.ปราจีนบุรี
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี และ
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์

ลักษณะประจำพันธุ์ ปีก, ปลายหาง สีเขียวแก่ ขนปลายหางงอนขึ้นข้างบน 2-3 เส้น ปากสีดำแกมน้ำเงิน

ขา-เท้า สีส้มอมดำ

เพศผู้ ขนตามลำตัวสีทึบเกือบดำ
ลำตัวปากสีดำแกมน้ำเงิน ขา-เท้า สีส้มอมดำ

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

1. อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรกเฉลี่ย 144 ± 21 วัน
2. น้ำหนักตัวเมื่อไข่ฟองแรกเฉลี่ย 1,300 กรัม
3. น้ำหนักไข่เฉลี่ย 65.02 ± 4.9 กรัม
4. น้ำหนักไข่ฟองแรกเฉลี่ย 55.28 ± 2.45 กรัม
5. ผลผลิตไข่เฉลี่ยปีละ 287 ± 10 ฟอง/แม่
6. น้ำหนักตัวเมื่อโตเต็มที่เฉลี่ยเพศผู้ $1,500 \pm 20$ กรัม เพศเมีย $1,300 \pm 40$ กรัม

การเลี้ยงเป็ดบางปะกง

การกกลูกเป็ดบนกรง



1. ขนาดกรงกก เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งเป็น 2 ช่อง กว้าง 1.00 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 1.00 เมตร
2. ขาตั้งกรงห่างจากพื้นดิน 0.50 เมตร
3. มีฝาตระแกรงปิดด้านบน 2 ช่อง
4. ด้านในมีดวงไฟ ขนาด 100 วัตต์ 1 หลอด
5. ถาดให้อาหาร จำนวน 1 ใบ
6. กระปุกน้ำ จำนวน 1 ใบ
7. เลี้ยงลูกเป็ดแรกเกิดจนถึง 7 วันได้ 200 ตัว ควรนำกระปุกน้ำออกจากกรงกก ช่วงเย็นเพื่อป้องกันลูกเป็ดเล่นน้ำตอนกลางคืน เพราะอาจจะทำให้ลูกเป็ดเปียกและหนาว เป็นสาเหตุระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหวัด



กกลูกเป็ดบนดินโดยจานกก



1. อุปกรณ์จานกกลูกเป็ด 1 จาน ต่อ ลูกเป็ดไข่ 500 ตัว
2. แผงกันกก ระยะสัปดาห์แรก ควรใช้แผงกันกก
3. ควรนำกระปุกน้ำออกในช่วงตอนเย็น เพื่อป้องกันเป็ดเล่นน้ำในตอนกลางคืน เพราะอาจทำให้เป็ดหนาวและตายได้
4. ถาดอาหาร 1 ถาด/ลูกเป็ด 100
5. กระปุกน้ำ 1 กระปุก/ลูกเป็ด 100 ตัว

ให้ค่าน้ำ

1. พื้นที่พอเหมาะสำหรับการกกลูกเป็ดโดยประมาณ 7-10 ตัว/ตารางฟุต
2. ลูกเป็ด อายุ 1-7 วัน แรกต้อง ดูแลเป็นพิเศษ เพราะถ้าไม่มีการกกลูกเป็ดอาจหนาวตาย อุณหภูมิที่ใช้ในการกก 1-7 วันแรก ประมาณ $85-90^\circ\text{F}$ แล้วลดลง สัปดาห์ละ 5°F หรือให้สังเกตว่าลูกเป็ดมีการกระจายตัวกันทั่วพื้นที่
3. ต้องหมั่นเปลี่ยนวัสดุรองพื้นอย่าให้แฉะ ถ้าเลี้ยงบนพื้นเล้า กรณีกกบนกรง ควรมีผ้าหรือกระสอบที่สะอาดปูพื้น ครั้งหนึ่งของพื้นที่กรง ด้านในส่วนมีไฟกก และควรเปลี่ยนผ้าหรือกระสอบทุกวัน
4. ช่วงกลางคืนควรเอากระปุกน้ำออก ป้องกันการเปียกชื้นและทำให้ลูกเป็ดเปียกน้ำ อาจทำให้เป็ดปอดบวมตาย
5. ระยะเวลากกลูกเป็ดในฤดูร้อนจะใช้เวลา 2 สัปดาห์